

**PERBEDAAN NILAI RATA-RATA LEBAR *MAXILLAE* DAN
MANDIBULAE ANTARA SISI KANAN DAN KIRI PADA
PENDERITA DENGAN PERGESERAN GARIS MEDIAN DI
KLINIK ORTODONSIA FKG UNAIR USIA 7-12 TAHUN**

SKRIPSI



Oleh :

IRMA YANTI

020012863

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PERBEDAAN NILAI RATA-RATA LEBAR *MAXILLAE* DAN
MANDIBULAE ANTARA SISI KANAN DAN KIRI PADA
PENDERITA DENGAN PERGESERAN GARIS MEDIAN DI
KLINIK ORTODONSIA FKG UNAIR USIA 7-12 TAHUN**

SKRIPSI


**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Pendidikan Dokter Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga Surabaya**

Oleh :

**IRMA YANTI
020012863**

Disetujui :

Pembimbing I



**Dr. Mieke Sylvia MAR., drg, M. S.
NIP. 130 675 829**

Pembimbing II



**Susy Kristiani, drg., M. Kes
NIP. 131 569 389**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :
pada *maxillae* dan *mandibulae* pria maupun wanita dengan pergeseran garis median didapatkan perbedaan lebar sisi kanan dan kiri yang bermakna kecuali pada *maxillae* pria dengan pergeseran garis median ke kanan dan *maxillae* wanita dengan pergeseran garis median ke kiri.

VI.2. Saran

Dalam penelitian ini masih terbatas pada perbedaan lebar akibat pergeseran garis median dari faktor *dental* sedangkan seperti dikemukakan Jerrold and Lowenstein³ bahwa pergeseran garis median dapat berupa *dental* maupun *skeletal*. Oleh karena itu diharapkan agar studi ini dilanjutkan dengan penelitian pada pergeseran garis median berupa *skeletal*. Di samping itu pada penelitian ini hanya terbatas pada penderita dengan pergeseran garis median di klinik Ortodonsia FKG Unair usia 7-12 tahun maka jumlah sampel yang didapatpun jumlahnya terbatas, sehingga diharapkan pula agar penelitian ini dapat dilanjutkan dengan sampel yang berbeda dan lebih banyak agar hasil yang diperoleh lebih akurat.